

予防接種カレンダー

◆お問い合わせ先◆

八代市保健センター
鏡保健センター

☎0965-32-7200 お名前()
☎0965-52-5277 生年月日(R . .)

予防接種名	対象年齢	予診票の色	標準的な接種年齢	接種回数	接種間隔・接種時期留意点	接種履歴(接種日記入欄)	※接種が済んだら記録しておきましょう					
ロタウイルス (1価) (5価)	R2.8.1以降に生まれた児	アイボリー	1回目は生後14週6日までに行う	2回 3回	接種は同じ種類のワクチンを続けて接種して下さい。 ロタリックス(1価): 1回目接種後 27日以上 の間隔で2回目 ロタテック(5価): 1回目接種後 27日以上 の間隔で2回目、接種後 27日以上 の間隔で3回目	1回目 R . . . (週)	4週間以上 2回目 R . . . (週)	4週間以上 3回目(ロタテックのみ) R . . . (週)				
	生後6週～24週まで											
	生後6週～32週まで											
B型肝炎	1歳に達するまで	薄ピンク	生後2月から生後9月未満	3回	27日以上の間隔で2回、更に、 初回接種から139日以上を経過した後 に1回	1回目 R . . . (か月)	4週間以上 2回目 R . . . (か月)	1回目接種から139日以上	3回目 R . . . (か月)			
ヒブ感染症(Hib)	生後2月～60月に達するまで 【5歳誕生日前日まで】 ※予防接種では、～達するまで、～未満、～以上、～至るまで、とは全て誕生日の前日を示します。	薄緑色	●初回1回目を生後2月～7月未満に開始	4回	初回接種は 生後12月までに27(20)日以上の間隔 で3回(56日までの間隔が望ましい)。追加接種は初回接種終了後 7月以上の間隔 で1回(13月までの間隔が望ましい)。ただし、生後12月までに3回の初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合、初回接種の最後の接種終了後27(20)日以上の間隔をおいて追加接種1回。	1回目 R . . . (か月)	4週間以上 2回目 R . . . (か月)	4週間以上 3回目 R . . . (か月)	7月以上 4回目(追加) R . . . (か月)			
			●初回1回目を生後7月～12月未満に開始	3回	初回接種は 生後12月までに27(20)日以上の間隔 で2回(56日までの間隔が望ましい)。追加接種は初回接種終了後 7月以上の間隔 で追加接種1回(13月までの間隔が望ましい)。ただし、生後12月までに2回の初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合、初回接種の最後の接種終了後27(20)日以上の間隔をおいて追加接種1回。					1回目 R . . . (か月)	4週間以上 2回目 R . . . (か月)	7月以上 3回目(追加) R . . . (か月)
			●初回1回目を生後12月～60月未満に開始	1回						R . . . (か月)		
			27日以上の間隔で初回接種3回 初回接種は 生後24月まで です。(生後12月までが望ましい)。追加接種は、初回接種終了後 60日以上 あけて 生後12月以降 に1回(生後12月～15月までが望ましい)。ただし、2回目の接種が生後12月を超えた場合、初回接種3回目は行いません。追加接種は実施可能。	1回目 R . . . (か月)	4週間以上 2回目 R . . . (か月)					4週間以上 3回目 R . . . (か月)	60日以上 1歳以降 4回目(追加) R . . . (か月)	
小児の肺炎球菌感染症	生後2月～60月に達するまで 【5歳誕生日前日まで】	青色	●生後2月～7月未満に開始	4回	27日以上の間隔で初回接種2回 初回接種は 生後24月まで です。(生後12月までが望ましい)。追加接種は、初回接種終了後 60日以上 あけて 生後12月以降 に1回。ただし、生後24月を超えた場合、初回接種2回目は行いません。追加接種は実施可能。	1回目接種日 R . . . (か月)	4週間以上 2回目接種日 R . . . (か月)	4週間以上 3回目接種日 R . . . (か月)	60日以上 1歳以降 3回目(追加) R . . . (か月)			
			●生後7月～12月未満に開始	3回	27日以上の間隔で初回接種2回 初回接種は 生後24月まで です。(生後12月までが望ましい)。追加接種は、初回接種終了後 60日以上 あけて 生後12月以降 に1回。ただし、生後24月を超えた場合、初回接種2回目は行いません。追加接種は実施可能。					1回目 R . . . (か月)	4週間以上 2回目 R . . . (か月)	60日以上 1歳以降 3回目(追加) R . . . (か月)
			●生後12月～24月未満に開始	2回	60日以上の間隔で初回接種 2回					R . . . (か月)	60日以上 2回目 R . . . (か月)	
			●生後24月～60月未満に開始	1回						R . . . (か月)		
四種混合 百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ	生後3月～90月に達するまで	うす黄色		4回	20日以上の間隔(56日までの間隔が望ましい)で初回接種3回。 初回3回目終了後、 6月以上(12月～18月) が望ましい置いて追加接種1回。	1回目 R . . . (か月)	3週間以上 2回目 R . . . (か月)	3週間以上 3回目 R . . . (か月)	6月以上 4回目(追加) R . . . (か月)			
BCG	生後直後～1歳に達するまで	空色	生後5月～8月	1回	生後5月過ぎてから生後8月に達するまでの接種が望ましい	R . . . (か月)						
麻しん風しん混合(MR)	1期 生後12月～24月に達するまで	白茶色	1歳の誕生日がきたら早めに受ける	1回	必ず第1期・第2期の2回の接種を済ませるようにしましょう。	1期 R . . . (歳)	2期 R . . . (歳)					
	2期 小学校就学前1年間		いわゆる「年長組」の間に受ける R2.4.1～R3.3.31	1回	令和2年度対象 H26.4.2～H27.4.1生							
水痘	生後12月～36月に達するまで	ピンク	生後15月までに1回目を行い、6月～12月あけてもう1回接種する	2回	1回目接種後、 3月以上 おく(6～12月が望ましい)	1回目 R . . . (か月)	3月以上 2回目 R . . . (か月)					
日本脳炎	1期 生後6月～90月に達するまで	藤色	1期初回: 3歳 1期追加: 4歳	3回	1期初回は、 6日以上 の間隔(28日までの間隔が望ましい)で2回。終了後、 6月以上 おいて(概ね1年が望ましい)追加接種1回。	1期1回目 R . . . (歳)	1週間以上 1期2回目 R . . . (歳)	6月以上 1期追加(3回目) R . . . (歳)	9歳以降 2期(4回目) R . . . (歳)			
	2期 9歳以上13歳未満		2期: 9歳	1回								
二種混合(DT) ジフテリア、破傷風	11歳以上13歳未満	濃緑色	11歳	1回	2期の接種期間であれば、三種・四種混合を規定回数受けてなくても二種混合1回分は定期接種となりますが、十分な抗体が得られていないので、不足する分を接種してください。(ただし任意接種となります。)	R . . . (歳)						
HPV感染症 (子宮頸がん等)	小6生～高1生相当(※女性のみ)	オレンジ色 クールグリーン	中学1年生 ※現在、積極的勧奨はしていません	3回	「サーバリックス」(2価) 又は、「ガーダシル」(4価) のどちらか 2価: 1回目接種後 1月以上 の間隔で2回目、1回目接種後 5月以上かつ2回目接種から2年半以上 の間隔で3回目 4価: 1回目接種後 1月以上 の間隔で2回目、2回目接種後 3月以上 の間隔で3回目	■ 2価と4価のワクチンがあります。接種間隔が異なるので注意してください。 ■ 3回の接種は全て同じ種類のワクチンを接種して下さい。						
任意接種	こどもインフルエンザ 【接種費用助成】 助成対象者: 生後6か月～小学校就学前まで 助成期間: 10月1日～12月31日 助成額: 1回につき上限1,000円、子ども一人につき2回まで助成					※詳細は市のホームページをご覧ください。						

●標準的な接種年齢とは、通常、接種を受けるのに一番適当な年齢(時期)です。この年齢をすぎても、対象年齢であれば接種できます。
●法律の改正などにより、予防接種の受け方が変わる可能性があります。「広報やつしろ」や市のホームページに掲載しますので、接種の前にはご確認ください。