

予防接種カレンダー

◆お問い合わせ先◆

八代市保健センター ☎32-7200
 鏡保健センター ☎52-5277

お名前 ()
 生年月日 (H . .)

種	期	定	予防接種名	対象年齢	予診票の色	標準的な接種年齢	接種回数	接種間隔・接種時期留意点	接種履歴(記入欄)							
									1回目接種日	27日以上	2回目接種日	1回目接種から139日以上	3回目接種日			
			B型肝炎	1歳に達するまで	うすピンク	生後2月から生後9月未満	3回	27日以上の間隔で2回、更に、初回接種から139日以上を経過した後に1回	1回目接種日 H . . . (か月)12月未満	27日以上	2回目接種日 H . . . (か月)12月未満	1回目接種から139日以上	3回目接種日 H . . . (か月)12月未満			
			ヒブ感染症 (Hib)	生後2月～60月に達するまで【5歳誕生日前日まで】 ※予防接種では、～達するまで、～未満、～以上、～至るまで、とは全て誕生日の前日を示します。	若竹色	●初回1回目を生後2月～7月未満に開始	4回	初回接種は生後12月までに27(20)日以上の間隔で3回(56日までの間隔が望ましい)。追加接種は初回接種終了後7月以上の間隔で1回(13月までの間隔が望ましい)。ただし、生後12月までに3回の初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合、初回接種の最後の接種終了後27(20)日以上の間隔をおいて追加接種1回。	1回目接種日 H . . . (か月) (生後2月～7月まで)	4週間以上	2回目接種日 H . . . (か月) (生後12月まで)	4週間以上	3回目接種日 H . . . (か月) (生後12月まで)	7月以上	4回目(追加) H . . . (か月) (生後60月まで)	
						●初回1回目を生後7月～12月未満に開始	3回	初回接種は生後12月までに27(20)日以上の間隔で2回(56日までの間隔が望ましい)。追加接種は初回接種終了後7月以上の間隔で追加接種1回(13月までの間隔が望ましい)。ただし、生後12月までに2回の初回接種を完了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合、初回接種の最後の接種終了後27(20)日以上の間隔をおいて追加接種1回。		1回目接種日 H . . . (か月) (生後7月～12月まで)	4週間以上	2回目接種日 H . . . (か月) (生後12月まで)	7月以上	3回目(追加) H . . . (か月) (生後60月まで)		
						●初回1回目を生後12月～60月未満に開始	1回								H . . . (か月) (生後60月まで)	
			小児の肺炎球菌感染症	生後2月～60月に達するまで【5歳誕生日前日まで】	青色	●生後2月～7月未満に開始	4回	27日以上の間隔で初回接種3回 初回接種は生後24月までです。(生後12月までが望ましい)。追加接種は、初回接種終了後60日以上あけて生後12月以降に1回(生後12月～15月までが望ましい)。ただし、2回目の接種が生後12月を超えた場合、初回接種3回目は行いません。追加接種は実施可能。	1回目接種日 H . . . (か月) (生後2月～7月まで)	4週間以上	2回目接種日 H . . . (か月) (生後24月まで) 12月超3回目無	4週間以上	3回目接種日 H . . . (か月) (生後24月まで)	60日以上	1歳以降	4回目(追加) H . . . (か月) (生後12月～60月まで)
						●生後7月～12月未満に開始	3回	27日以上の間隔で初回接種2回 初回接種は生後24月までです。(生後12月までが望ましい)。追加接種は、初回接種終了後60日以上あけて生後12月以降に1回。ただし、生後24月を超えた場合、初回接種2回目は行いません。追加接種は実施可能。		1回目接種日 H . . . (か月) (生後7月～12月まで)	4週間以上	2回目接種日 H . . . (か月) (生後24月まで)	60日以上	1歳以降	3回目(追加) H . . . (か月) (生後12月～60月まで)	
						●生後12月～24月未満に開始	2回	60日以上の間隔で初回接種2回				1回目 H . . . (か月) (生後12～24月)	60日以上	2回目 H . . . (か月) (生後60月まで)		
						●生後24月～60月未満に開始	1回									H . . . (か月) (生後60月まで)
			不活化ポリオ(IPV)	生後3月～90月に達するまで	白色	●初回接種は生後3月～12月未満	4回	20日以上の間隔で初回接種3回。初回3回目終了後、6月以上(12月～18月)が望ましい置いて追加接種1回。	1回目接種日 H . . . (か月) (生後3月～12月頃)	3週間以上	2回目接種日 H . . . (か月) (生後3月～12月頃)	3週間以上	3回目接種日 H . . . (か月) (生後3月～12月頃)	6月以上	4回目(追加) H . . . (か月) (生後90月まで)	
			四種混合 百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ	生後3月～90月に達するまで	うす黄色	※四種混合(DPT-IPV)は、三種混合(DPT)と不活化ポリオ(IPV)の混合ワクチン	4回	20日以上の間隔(56日までの間隔が望ましい)で初回接種3回。初回3回目終了後、6月以上(12月～18月)が望ましい置いて追加接種1回。								
			BCG	生後直後～1歳に達するまで	空色	生後5月～8月	1回	生後5月過ぎてから生後8月に達するまでの接種が望ましい	接種日 H . . . (か月)(生後12月まで)							
			麻しん風しん混合(MR)	1期 生後12月～24月に達するまで	白茶色	1歳の誕生日がきたら早めに受ける	1回	必ず第1期・第2期の2回の接種を済ませるようにしましょう。	1期接種日 H . . . (か月) (生後12月～24月まで)							
				2期 小学校就学前1年間		1回	H30年度対象生年月日(H24.4.2～H25.4.1生)	2期接種日 H . . . (小学校就学前年度1年間)【年長組】								
			水痘	生後12月～36月に達するまで	ピンク	生後15月までに1回目をを行い、6月～12月あけてもう1回接種する	2回	1回目接種後、3月以上おく(6～12月)が望ましい	1回目接種日 H . . . (か月)(生後12～36月まで)	3月以上	2回目接種日 H . . . (か月)(生後12～36月まで)					
			日本脳炎	1期 生後6月～90月に達するまで	藤色	1期初回:3歳 1期追加:4歳	3回	1期初回は、6日以上の間隔(28日までの間隔が望ましい)で2回。終了後、6月以上おいて(概ね1年)が望ましい追加接種1回。	1期1回目 H . . . (歳) (3歳頃)	1週間以上	1期2回目 H . . . (歳) (3歳頃)	6月以上	3回目(追加) H . . . (歳) (4歳頃)	9歳以降	4回目(2期) H . . . (歳) (9歳～13歳)	
				2期 9歳以上13歳未満		1回										
			二種混合(DT)ジフテリア、破傷風	11歳以上13歳未満	若草色	11歳	1回	2期の接種期間であれば、三種・四種混合を規定回数受けてなくても二種混合1回分は定期接種となりますが、十分な抗体が得られていないので、不足する分を接種してください。(ただし任意接種となります。)	接種日 H . . . (歳)(11歳～13歳未満)							
			HPV感染症(子宮頸がん等)	小6生～高1生相当(※女性のみ)	オレンジ色 クールグリーン	中学1年生	3回	「サーバリックス」(2価)又は、「ガーダシル」(4価)のどちらか 2価:1回目接種後1月以上の間隔で2回目、1回目接種後5月以上かつ2回目接種から2年半以上の間隔で3回目 4価:1回目接種後1月以上の間隔で2回目、2回目接種後3月以上の間隔で3回目	2価ワクチンと4価ワクチンの2種類があり、それぞれ接種間隔が異なるので注意してください。 3回の接種は全て同じ種類のワクチンを接種して下さい。							
任意接種	主な任意接種…料金は有料(自費接種)です。 ● Oロタウイルス ● おたふくかぜ ● インフルエンザ(65歳未満)															

●標準的な接種年齢とは、通常、接種を受けるのに一番適当な年齢(時期)です。この年齢をすぎても、対象年齢であれば接種できます。
 ●法律の改正などにより、予防接種の受け方が変わる可能性があります。「広報やつしろ」や市のホームページに掲載しますので、接種の前にはご確認下さい。